妊娠を考えている方・妊娠中の方への推奨ワクチン一覧

	ウイルス	感染経路	病態	抗体検査	免疫基準値	ワクチン名		製品名	推奨される接種時期
1	麻疹 (ましん)	母体感染 胎児感染	母体:重症肺炎、髄膜炎 胎児:流産、早産、胎児死亡、先天性麻疹	EIA法-IgG	16.0 以上	MRワクチン (麻疹、風疹)	国産	ミールピック	妊娠前 *妊娠する 2ヶ月前までに 接種
2	風疹 (ふうしん)	胎児感染	先天性風疹症候群 (難聴、心疾患、眼球異常など)	HI法 EIA法-IgG	32倍 以上 8.0 以上		国産	乾燥弱毒生麻疹風しん混合ワクチン「タケダ」	
3	ムンプス (おたふくかぜ)	胎児感染	流産、心筋疾患	EIA法-IgG	4.0 以上	国産	おたふくかぜ生ワクチン 「第一三共」		
						国産	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		
						輸入	MMRワクチン (麻疹、風疹、おたふくかぜ)	PRIORIX	
4	水痘 (みずぼうそう)	母体感染 胎児感染	母体:重症肺炎 胎児:先天性水痘症候群 (眼球異常・四肢形成不全・精神発達遅滞)	EIA法-IgG	4.0 以上	水痘ワクチン	国産	乾燥弱毒生水痘ワクチン 「ビケン」	
5	B型肝炎 *医療者など	出産時: 産後母子感染	急性・慢性B型肝炎、 キャリア化	HBs抗体CLIA法	10.0 mIU/mL	B型肝炎ワクチン	国産	ヘプタックス-II水性懸濁 注シリンジ	
							輸入	Engerix-B	
6	インフルエンザ	母体感染 新生児の感染	流行期の母体感染による 早産リスク 新生児への感染による 様々な合併症	通常実施なし	-	インフルエンザワクチン	国産	インフルエンザHAワクチン	
7	百日咳	産後: 新生児に感染	百日咳による呼吸不全、 呼吸停止	通常実施なし	-	3種混合ワクチン T-dap	輸入	boostrix	妊娠中 (27~36週)
8	RS	産後: 新生児に感染	新生児・乳幼児への感染 による呼吸器症状の重症化 (肺炎や気管支炎による呼吸不全)	通常実施なし	-	RSウイルスワクチン	国産	アプリスボ筋注用	妊娠中 (28~36週)